


Din hund kan også få **Borreli**a!

Tekst: KLARTXT



Selvom sæsonen for skovflåter så småt er ved at klinge af, så kan man stadig være så uheldig at træffe dem i stort tal på efterårets jagter. Og mange vælger også at tage hunden med på jagt i Sverige, hvor flåt problemerne er endnu større end i Danmark.

De fleste er klar over, at man kan få borreli, og at det er en rigtig ubehagelig sygdom. Men også hunde kan få borreli. Symptomerne hos hunden er feber, træthed, hævede lymfeknuder, ømhed i led og muskler, lammelse af ansigtsnerven og ændringer i hundens normale adfærd. Ved angreb på nervesystemet kan der også forekomme epileptiske anfald og funktionsforstyrrelser af hjertet. Så det er heller ikke nogen rar oplevelse for hunden at få borreli, selvom de ofte kommer sig relativt hurtigt med en antibiotika behandling.



Tyggetabletter

Men hvad kan man gøre for at undgå, at hunden bliver syg. Jeg har taget et kikk på nogle af de mest brugte, og effektive, præparater på markedet. De to første, NexGard og Bravecto, er på recept. De er begge to tyggetabletter (selvom mine egne hunde mere sluger end tygger dem – de smager åbenbart rasende godt for en hund), og virkningen af NexGard holder i en måned, og Bravecto holder i hele tre måneder. Fælles for dem begge er, at de først virker, når flåten begynder at suge blod. Derfor er der også en risiko for, at hunden under uheldige omstændigheder kan blive smittet alligevel. Til gengæld kan hunden svømme lige tosset, den vil, også lige efter indtagelsen af tyggetabletten, og man behøver ikke tænke på, om det nu er sikkert at have hunden i sofaen eller lade børnene klappe den.

Spot-on

Det er til gengæld et issue med de to andre produkter, Frontline og Bayvantic, som er såkaldte spot-on produkter. Det betyder, at man drypper produktet direkte på huden i nakken på hunden. Det tager et stykke tid, før præparatet har fordelt sig ud over hele hunden – ca. to dage – og i det tidsrum må hunden helst ikke komme ud at svømme, ligesom man heller ikke bør lade børn og barnlige sjæle klappe hunden eller lade den opholde sig i møbler, hvor familien selv har tænkt sig at være. Disse produkter er altså lidt mere sarte overfor påvirkninger udefra end de to første, og man skal også omgå hunden mere forsigtigt de første par dage. Til gengæld slår de flåten ihjel, inden den når at suge blod, da det aktive stof er i fedtlaget på overhuden af hunden. Man skal dog alligevel være lidt forsigtig, for det er ikke sikkert, at præparatet er fordelt ud over hele hunden, så enkelte flåter kan under uheldige omstændigheder alligevel sætte sig fast og måske overføre sygdomme.

Livrem og seler

Hvis man ved, at man skal et sted hen med hunden, hvor der er mange flåter, som f.eks. Sverige, så kunne man overveje en kombination af en tyggetablet og et spot-on middel. Hvis det ene middel kikker en smule, så kan det andet måske opfange den flåt, som var på vej med en dosis borrelia eller andet ubehageligt. Nogle vil måske kalde det at gå med livrem og seler – men hvorfor egentlig ikke, når man nu ved, at risikoen er der?

Du kan læse mere om de fire produkter på de næste sider.

NexGard

NexGard anvendes til behandling af angreb med lopper og flåter hos hunde og indeholder det aktive stof Afoxolaner.

Det udleveres kun efter recept.

NexGard dræber lopper i løbet af 8 timer og flåter i løbet af 48 timer. Efter indgivelse holder virkningen sig i mindst 5 uger mod lopper og op til 4 uger mod flåter.

Det aktive stof i NexGard, Afoxolaner, dræber parasitter, der lever på eller i huden eller i pelsen på dyr, såsom lopper, flåter og mider. For at det aktive stof virker, skal lopper og flåter først hægte sig fast i huden og begynde at suge blod, og derfor kan risikoen for sygdomme overført fra parasitter ikke helt udelukkes.

NexGards effektivitet er undersøgt i både laboratorieundersøgelser og feltstudier. I en EU-feltundersøgelse med 146 hunde med angreb af lopper og/eller flåter var en enkelt behandling med NexGard effektiv i op til 30 dage efter behandlingen. NexGard reducerede antallet af lopper og flåter med mindst 98 % og var mindst lige så effektivt som et spot-on-lægemiddel, der indeholder pyriprol (et andet lægemiddel mod lopper og flåter).

Produktet bør ikke bruges til drægtige eller diegivende hunde, da effekten ikke er undersøgt. Vask hænderne efter at have håndteret produktet.

Bravecto

Tyggetablet til behandling af flåt- og loppeangreb hos hunde, som indeholder det aktive stof Fluralaner.

Det udleveres kun efter recept.

Det giver øjeblikkelig og vedvarende virkning på lopper i 12 uger og øjeblikkelig og vedvarende virkning på flåter i 12 uger.

Lopper og flåter skal bide sig fast på værten og starte indtag af føde, før de udsættes for det aktive stof. Effekten indtræder inden for 8 timer, efter lopper har bidt sig fast, og 12 timer efter flåter har bidt sig fast.


Parasitten skal have startet indtag af føde fra værten, før den udsættes for Fluralaner, derfor kan risikoen for sygdomme overført fra parasitter ikke udelukkes.

På grund af manglende data bør det ikke anvendes til hvalpe under 8 uger og/eller hunde, der vejer mindre end 2 kg.

Bravecto kan bruges til drægtige og diegivende hunde.

Tyggetabletterne må ikke knuses eller deles.

Vask hænderne grundigt med vand og sæbe straks efter håndtering af produktet.



Frontline Combo vet.

Spot-on opløsning til hund.

Anvendes mod angreb af lopper, flåter og/eller bidende lus hos hunde.

Præparatets virkning over for flåter varer i op til 4 uger.

Det aktive stof Fipronil dræber lopper inden for 24 timer og flåter og lus inden for 48 timer efter at produktet er påført hunden.

Præparatet kan anvendes under drægtighed og diegivning.

Frontline påføres i nakken lige foran skulderbladene.

Anbring toppen af pipetten på huden og klem pipetten

adskillige gange for at få indholdet fuldstændig ud og direkte ned på huden på ét og samme sted. Påfør Frontline på et område, hvor dyret ikke kan slikke det af. Undgå også at dyr slikker hinanden efter behandlingen.

Undgå badning inden for 2 dage efter behandling med præparatet og badning hyppigere end en gang om ugen, da der ikke foreligger nogen undersøgelser om, hvordan dette påvirker præparatets virkning.

Enkelte flåter kan, trods behandling, sætte sig fast. Derfor kan overførsel af sygdomme ikke helt udelukkes, såfremt betingelserne er ugunstige.

Omgå hunden med forsigtighed indtil påføringsstedet er tørt (gælder især for børn). Dette kan f.eks. sikres ved at behandle dyrene om aftenen. Nyligt behandlede dyr må IKKE gives lov til at sove sammen med deres ejere/husets børn.

Frontline kan forårsage irritation af slimhinder, hud og øjne hos mennesker. Undgå derfor kontakt med mund, hud og øjne. Undgå at få pipettens indhold på fingrene. Hvis dette sker, vaskes hænderne med sæbe og vand. Hvis præparatet ved et uheld kommer i øjnene, skal der skylles omhyggeligt med vand.

Vask hænderne efter brug.



Se her!

DOGGY HUNDEBURE

Danmarks største udvalg

Priser fra kr.
999,95



AM
Handel
www.am-handel.dk
Tlf: 28 57 44 41



Bayvantic Vet.

Spot-on opløsning til hund.

Bayvantic Vet. indeholder Imidacloprid og Permethrin.

Bayvantic virker både afskrækkende og giftigt på flåter i 4 uger.

Flåter, som allerede er på hunden, dræbes ikke med sikkerhed inden for 2 dage efter behandling. Det anbefales at fjerne disse flåter, inden behandling foretages, så de forhindres i at fæstne sig og suge blod.

En behandling har afskrækkende ("anti-blodsugende") virkning på sandfluer i 2 uger, på myg i 4 uger og på almindelige stikfluer i 4 uger.

Bør ikke anvendes til hvalpe under 7 uger.

Kan anvendes under drægtighed og diegivning.

Enkelte flåter kan, trods behandling, sætte sig fast. Derfor kan overførsel af sygdomme ikke helt udelukkes, såfremt betingelserne er ugunstige.

Påfør Bayvantic på et område, hvor dyret ikke kan slikke det af.

Undgå også at dyr slikker hinanden efter behandlingen.

Bayvantic er særdeles giftigt for katte og kan være livsfarligt for dem. For at forhindre at katte ved et uheld bliver forgiftet, bør behandlede hunde holdes væk fra katte indtil påføringsstedet er tørt. Det er vigtigt at sikre sig, at katte ikke slikker på den behandlede hunds påføringssted.


Søg straks dyrlæge hvis dette sker.

Hunden må IKKE få adgang til nogen form for overfladevand i mindst 48 timer efter påføringen, da præparatet er skadeligt for organismer i vandet.

Bayvantic forbliver virksomt, også selvom dyret bliver vådt. Imidlertid bør langvarig, intens udsættelse for vand undgås. I tilfælde af hyppig udsættelse for vand kan virkningen nedsættes.

Omgå hunden med forsigtighed indtil påføringsstedet er tørt (gælder især for børn). Dette kan f.eks. sikres ved at behandle dyrene om aftenen. Nyligt behandlede dyr må IKKE gives lov til at sove sammen med deres ejere/husets børn.

Vask hænderne grundigt efter brugen.



En ekstra bonus ved alle de nævnte midler mod flåter er, at de også er meget effektive mod lopper. De er flere midler mod flåter og lopper end de her nævnte, og din dyrlæge kan garanteret hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om bekæmpelse af utøj på din hund.